

Jilguero



Jilguero. Macho. 11 de diciembre.

JILGUERO (*Carduelis carduelis*)

IDENTIFICACIÓN

11-13 cm. Dorso pardo y partes inferiores claras; obispillo claro; cola blanca y negra; alas negras con una ancha banda amarilla; cabeza con color rojo, blanco y negro; los **juveniles** tienen la cabeza de color gris-blanco uniforme.

ESPECIES SIMILARES

El diseño de la cabeza hace inconfundibles a los **adultos**; los **juveniles** se reconocen por el diseño del ala y la cola.

SEXO

Machos con mayor cantidad de rojo en la cabeza, extendiéndose por detrás del ojo; plumillas nasales negras; pequeñas coberteras negras, si acaso con algo de pardo en las puntas.

Hembras menos rojo en la cabeza, extendiéndose poco por detrás el ojo; plumillas nasales grises o gris-negro; pequeñas coberteras con un borde ancho de color pardo (a veces tan estrecho como en los machos). Los **juveniles** no pueden sexarse antes de su muda **postjuvenil**.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con la cabeza de color pardo, sin manchas rojas y negras.


1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las grandes coberteras mudadas y las más externas retenidas, menos negras; si han cambiado todas las grandes coberteras el contraste está entre estas y las coberteras primarias.

Adultos con las plumas del ala de la misma generación, sin contrastes.

CUIDADO: hay unos pocos **juveniles** que realizan una muda **postjuvenil** completa.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada entre mediados de septiembre y octubre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y gran parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa. La muda **postjuvenil** suele estar terminada entre mediados de octubre y primeros de noviembre, dependiendo de la fecha de nacimiento.



Jilguero. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibándose migrantes europeos en invierno. Está repartido por toda la Comunidad faltando únicamente en las partes más altas del Pirineo y en zonas deforestadas de la Depresión del Ebro..



Jilguero. Hembra.

Jilguero



Jilguero. Juvenil.



Jilguero. Diseño del capirote: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil.



Jilguero. Macho: diseño de las pequeñas coberteras.



Jilguero. Hembra: diseño de las pequeñas coberteras.



Jilguero. Diseño del pecho: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil



Jilguero. Diseño de la cabeza: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil



Jilguero. Verano. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

Jilguero



Jilguero. Diseño del dorso: izquierda adulto derecha juvenil.



Jilguero. Ala de juvenil.



Jilguero. Hembra. Muda postjuvenil. Ala de 1º año.



Jilguero. Macho. Muda postjuvenil. Ala de 1º año.



Jilguero. Hembra. Muda postnupcial. Ala de adulto.



Jilguero. Macho. Muda postnupcial. Ala de adulto