

Verdecillo



Verdecillo. Macho. 6 de junio.

VERDECILLO (*Serinus serinus*)

IDENTIFICACIÓN

11-12 cm. Dorso de color amarillento, teñido de pardo; vientre blanco, con estrías; obispillo amarillo; pico ancho y corto; garganta y frente amarillas en el macho, rayadas en la hembra.

ESPECIES SIMILARES

De las especies con colores verdes y amarillos el **verderón** es de un tamaño mucho mayor (14-15 cm.); la hembra del **lúgano** tiene la banda del ala más ancha y amarillo en las plumas de la cola; el **verderón serrano** no tiene estrías en los flancos o, en los juveniles, son muy tenues.



Arriba izquierda verderón; arriba derecha hembra de lúgano; izquierda verderón serrano

SEXO

Machos con frente, garganta y pecho amarillo y sin listas; **hembras** con frente listada, garganta y pecho blanco verdoso con tintes amarillentos. Los **juveniles** no pueden sexarse antes de su muda **postjuvenil**. **CUIDADO:** hay ejemplares intermedios (frente listada y garganta y pecho amarillos) que no se pueden sexar.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con aspecto parecido al de las hembras, pero son más rojizos; obispillo rayado; plumaje nuevo


1º año otoño/2º año primavera en **machos** con contraste entre las plumas de la cola cambiadas (redondeadas) o retenidas (puntiagudas por desgaste) y entre las plumas del ala mudadas y retenidas; si han cambiado todas las grandes coberteras hay que buscar el contraste en cobertera carpal y álula.

Adultos con las plumas de la cola (redondeadas) y ala de la misma generación, sin contrastes.

CUIDADO: hay **juveniles** que realizan una muda **postjuvenil** completa.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada entre agosto y noviembre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y gran parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa; es frecuente también cambiar el par central de la cola, si bien puede ser mudada completamente; puede durar hasta mitad de octubre dependiendo de la fecha de nacimiento.



Verdecillo. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibándose migrantes europeos en invierno y con tendencia de la población local de desplazarse hacia el sur fuera de la época de cría. Está repartido por toda la Comunidad faltando únicamente en las zonas deforestadas del alto Pirineo y de la Depresión del Ebro.

Verdecillo



Verdecillo. Hembra.



Verdecillo. Diseño del capote: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil




Verdecillo. Juvenil.



Verdecillo. Diseño del pecho. Arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil



Verdecillo. Diseño de la cabeza: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil.




Verdecillo. Primavera. Desgaste de la cola: izquierda adulto/2º año; centro 2º año; derecha juvenil.

Verdecillo



Verdecillo. Diseño del dorso y obispillo: izquierda macho; centro hembra; derecha juvenil .




Verdecillo. Macho. Muda postjuvenil: ala de 2º año.



Verdecillo. Ala de juvenil



Verdecillo. Hembra. Muda postnupcial: ala de adulto.



Verdecillo. Hembra. Muda postjuvenil: ala de 2º año.



Verdecillo. Macho. Muda postnupcial: ala de adulto.