

Verderón común



Verderón común. Primavera. Macho. 13 de junio.

VERDERÓN COMÚN (*Carduelis chloris*)

IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. Color verde oliváceo, con pico fuerte y claro; franja alar y laterales de la cola amarillos; **juveniles** más apagados y moteados en vientre y dorso

ESPECIES SIMILARES

De las especies con colores verdes y amarillos, el **lúgano** y **verderón serrano** presentan amplias bandas amarillas en las alas; el **verdecillo** es de un tamaño mucho menor (11-12 cm.)



Arriba izquierda verdecillo; arriba derecha lúgano; izquierda verderón serrano

SEXO

Es posible sexar a los juveniles recién salidos del nido: en los **machos**, el amarillo de las primarias 8 a 6 y el de las rectrices externas llega hasta el raquis. En las **hembras**, el amarillo de las primarias 8 a 6 y el de las rectrices externas no llega hasta el raquis. Después de la muda **postjuvenil**, **machos** con colores amarillos y verdes más vivos; dorso liso; las **hembras** tienen un color más apagado y fino barreado en el dorso.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con aspecto parecido al de las hembras, pero con colores muy apagados y barreado en el dorso y partes inferiores; plumaje nuevo.


1º año otoño/2º año primavera con contraste entre las plumas de la cola cambiadas (redondeadas) o retenidas (puntiagudas por desgaste) y entre las grandes coberteras mudadas y retenidas; si han cambiado todas las grandes coberteras hay que buscar el contraste de muda en terciarias o entre plumas del álula y coberteras primarias o entre primarias renovadas de forma excéntrica; coberteras primarias marronáceas y sin punta gris.

Adultos con las plumas de la cola (redondeadas) y ala de la misma generación, sin contrastes; coberteras primarias con borde verde y punta gris.

CUIDADO: hay **juveniles** que realizan una muda **postjuvenil** completa.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada entre octubre y noviembre. Muda **postjuvenil** frecuentemente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y la mayor parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras y terciarias, llegando en algunos a ser una muda completa.; es frecuente también cambiar el par central de la cola, si bien puede ser mudada completamente. La muda **postjuvenil** puede durar hasta noviembre dependiendo de la fecha de nacimiento.



Verderón común. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibándose migrantes en invierno. Repartido por toda la Comunidad, falta únicamente en las zonas altas del Pirineo y áreas deforestadas de la Depresión del Ebro.

Verderón común



Verderón común. Primavera. Hembra.



Verderón común. Invierno. Hembra.



Verderón común. Primavera. Juvenil. Hembra.



Verderón común. Invierno. Macho.




Verderón común. Primavera. Juvenil. Macho.



Verderón común. Extensión del amarillo junto al raquis de las primarias 6 a 8: arriba macho; abajo hembra.





Verderón común



Verderón común. Extensión del amarillo en la cola: izquierda macho; derecha hembra.




Verderón común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra



Verderón común. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda macho; arriba hembra; izquierda juvenil.



Verderón común. Invierno. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Verderón común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil.



Verderón común. Macho. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto; abajo 2º año.




Verderón común. Invierno. Diseño de la cabeza: izquierda macho (03-XI); derecha hembra (03-XI).

Verderón común



Verderón común. Hembra. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto); abajo 2º año.



Verderón común. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda macho; arriba derecha hembra; izquierda juvenil.



Verderón. Primavera. Desgaste de la cola: arriba izquierda adulto/2º año;



Verderón. Invierno. Desgaste de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Verderón común. Invierno. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Verderón común. Hembra: ala de juvenil.



Verderón común. Hembra. Muda postnupcial: ala de adulto.



Verderón común. Macho: ala de juvenil.



Verderón común. Macho. Muda postnupcial: ala de adulto.



Verderón común. Hembra. Muda postjuvenil: ala de 2º año.



Verderón común. Macho. Muda postjuvenil: ala de 2º año.